

Inviare a: segreteria@odc-raphael.itNO CONSEGNA A MANO

DATA ARRIVO RICHIESTA _____

DATA RICOVERO _____

 proposta ricovero **valutazione a 24 ore dal ricovero****DATI PAZIENTE**

COGNOME _____

NOME _____

DATA DI NASCITA ____ / ____ / ____ LUOGO DI NASCITA _____

SESSO	M	F
-------	---	---

CODICE FISCALE _____

COMUNE DI RESIDENZA _____ PROVINCIA _____

PROVENIENZA REPARTO OSPEDALIERO _____
(indicare reparto e struttura) DOMICILIO _____ COT _____ ALTRO _____

MEDICO PROPONENTE

MEDICO PROPONENTE _____

TELEFONO _____ TELEFONO 2 _____

INDIRIZZO MAIL _____

CAREGIVER DI RIFERIMENTO

COGNOME E NOME _____

GRADO DI PARENTELA _____

TELEFONO _____ TELEFONO 2 _____

DIAGNOSIDIAGNOSI PRINCIPALE _____
_____DIAGNOSI SECONDARIA _____

ALLERGIE _____

RISCHIO INFETTIVO _____

TIPO DI DIETA _____

MOBILITA' _____

UTILIZZO PRESIDI ASSORBENTI _____

FINALITA' DEL RICOVERO E SETTING

VIVE CON _____

FINALITA' DEL RICOVERO _____
_____SETTING PROPOSTO AL TERMINE DEL RICOVERO _____

DATA DIMISSIONE DALLA STRUTTURA INVIANTE PREVISTA PER _____

SCALA NEWS SCORE
Tabella 1

PARAMETRI FISIOLOGICI	3	2	1	0	1	2	3
Frequenza del respiro	≤ 8		9-11	12-20		20-24	≥ 25
Saturazione d'ossigeno	≤ 91	92-93	94-95	≥ 96			
Ossigeno supplementare		SI		NO			
Temperatura corporea	≤ 35,0		35,1 - 36,0	36,1 - 38,0	38,1 - 39,0	≥ 39,1	
Pressione sistolica	≤ 90	91 - 100	101 - 110	111 - 219			≥ 220
Frequenza Cardiaca	≤ 40		41 - 50	51 - 90	91 - 110	111 - 130	≥ 131
Stato di coscienza				Vigile			Richiamo verbale dolore provocato coma

Tabella 2

PUNTEGGIO NEWS	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	RISPOSTA CLINICA
0	Minimo ogni 12 ore	Continuare l'uso della carta NEWS
Totale: 1-4	Minimo ogni 4-6 ore	Allertare il personale infermieristico direttamente responsabile del paziente. Il personale decide il livello di allerta necessario.
Totale: ≥ 5	Almeno ogni ora	L'infermiere informa il team medico. Il medico responsabile valuta urgentemente il paziente. Il livello assistenziale deve essere adeguato alla gravità clinica.
Totale: ≥ 7	Monitoraggio continuo	L'infermiere chiama in emergenza il team medico. Il team medico provvede alle cure ed eventualmente chiama lo specialista. Viene preso in considerazione il trasferimento in un reparto subintensivo o intensivo.

BISOGNO ASSISTENZIALE		PUNTEGGIO	MEDICO	INFERMIERE
1	<i>Funzione cardiocircolatoria</i>			
	Senza aiuto / sorveglianza	1		
	Parametri <3 rilevazioni die *	2		
	Parametri > 3 rilevazioni die *	3		
	Scompenso cardiaco classe NYHA 1-2	2		
	Scompenso cardiaco classe NYHA 3	3		
	Scompenso cardiaco classe NYHA 4	4		
	Peso corporeo giornaliero o plurisettimanale	3		
	Quantità urine	2		
2	<i>Funzione respiratoria</i>			
	Senza aiuto / sorveglianza	1		
	Difficoltà respiratoria da sforzo lieve-moderata	2		
	Dispnea da sforzo grave	3		
	Dispnea a riposo	4		
	Secrezioni abbondanti da tracheoaspirare	4		
	Tosse acuta / cronica	3		
	Parametri < 3 rilevazioni die	2		
	Parametri > 3 rilevazioni die	3		
	Ossigenoterapia	3		
	Necessità di ventilazione notturna	3		
	Presenza di tracheostomia	4		
	Terapia con nebulizzazioni	3		
3	<i>Medicazioni</i>			
	Assenza di medicazioni	1		
	Lesione da pressione o ulcera (stadio 1-2)	2		
	Lesione da pressione o ulcera (stadio 3)	3		
	Lesione o ulcera (stadio 4 o sedi multiple)	4		
	Ferita chirurgica non complicata	2		
	Ferita chirurgica complicata (deiscenza, infusione)	3		
	Moncone di amputazione da medicare	3		
	Ulcera da piede diabetico: ulcera vascolare, neuropatica	3		
	Stomia recente da medicare	3		
	Altre medicazioni complesse o sedi multiple **	4		
4	<i>Alimentazione e idratazione</i>			
	Senza aiuto / sorveglianza	1		
	Prescrizione dietetica	2		
	Necessità di aiuto per azioni complesse	2		

	Necessità di aiuto costante nell'alimentarsi	3		
	Presenza di disfagia lieve	3		
	Presenza di disfagia moderata-severa	4		
	Nutrizione enterale (SNG o PEG recente)	3		
5	Eliminazione			
	Senza aiuto / sorveglianza	1		
	Monitoraggio alvo	2		
	Necessità di clisma	3		
	Necessità di essere accompagnato al WC	3		
	Gestione della stomia	3		
	Presidi assorbenti solo di notte / pappagallo	2		
	Inkontinenza fecale / urinaria (utilizzo di presidi assorbenti 24h/24)	3		
	Cateterismo durante il ricovero / a lunga permanenza	3		
6	Igiene e abbigliamento			
	Senza aiuto / sorveglianza	1		
	Necessità di aiuto solo per igiene completa (bagno o doccia)	2		
	Necessità di aiuto cura anche per cura igienica parziale/vestirsi	3		
	Totale dipendenza / assenza di collaborazione	4		
7	Movimento			
	Senza aiuto / sorveglianza	1		
	Utilizza in modo autonomo presidi per movimento	2		
	Necessità di aiuto costante per la deambulazione	3		
	Mobilizzazione in poltrona e/o cambi posizione nel letto	3		
	Necessità di utilizzare sollevatore	4		
	Allettamento obbligatorio / immobilità nel letto	4		
8	Riposo e sonno			
	Senza aiuto / sorveglianza	1		
	Sonno indotto da farmaci	2		
	Disturbi del sonno	3		
	Agitazione notturna costante	4		
9	Sensorio e comunicazione			
	Senza aiuto / sorveglianza	1		
	Difficoltà in forma lieve: vista e/o udito e/o linguaggio	2		
	Difficoltà in forma grave: vista e/o udito e/o linguaggio	3		
	Deficit cognitivo lieve	2		
	Deficit cognitivo moderato	3		
	Deficit cognitivo grave	4		
	Stato costante di apatia / agitazione / aggressività	4		

10	Ambiente sicuro / situazione sociale			
	Senza aiuto / sorveglianza	1		
	Apparecchi medicali a domicilio	2		
	Rischio caduta medio - alto	4		
	Uso di mezzi di protezione	4		
	Attivazione assistente sociale	3		
	Educazione sanitaria del care-giver	2		
	Pianificazione dimissioni con altre istituzioni	3		
11	Terapie			
	Assenza di terapia	1		
	Terapia solo orale 1 o 2 volte al giorno	2		
	Terapia più di 2 volte al die	3		
	Trattamento Infusivo (antibiotici / elettroliti ecc.) 1 v/die	2		
	Trattamento infusivo (antibiotici / elettroliti ecc.) più vv/die	3		
	Antibiotico in infusione continua	3		
	Terapia infusionale continua con inotropi, vasodilatatori	4		
	Nutrizione parenterale totale	3		
12	Altri bisogni clinici			
	Assenza di altri bisogni clinici	1		
	Monitoraggio settimanale ematochimici	2		
	Monitoraggio plurisettimanale ematochimici	3		
	Necessità di consulenze specialistiche	3		
	Necessità di follow-up strumentale	3		
	Necessità di fisioterapia di gruppo	2		
	Necessità di fisioterapia individuale	3		
	Comorbilità lieve (CIRS-C < 3)	2		
	Comorbilità lieve (CIRS-C > 3)	3		
	Necessità di educazione sanitaria del paziente	2		

LEGENDA

* Parametri vitali: PA, FC, FR, TC, SAT O₂, DOLORE

** CVC, CVP, ecc..

SCHEMA RIASSUNTIVA

Viene assegnato il valore più alto per ogni bisogno assistenziale ed il valore assegnato con maggiore frequenza costituisce l'indice di intensità assistenziale.

Nel caso vi sia un risultato di parità tra i valori attribuiti si assegna il valore più alto.

VALUTAZIONE INDICE INTENSITA' ASSISTENZIALE					
	INDICATORE - BISOGNO	1	2	3	4
1	Funzione cardiocircolatoria				
2	Funzione respiratoria				
3	Medicazioni				
4	Alimentazione ed idratazione				
5	Eliminazione				
6	Igiene e abbigliamento				
7	Movimento				
8	Riposo e sonno				
9	Sensorio e comunicazione				
10	Ambiente sicuro - situazione sociale				
11	Terapie				
12	Altri bisogno clinici				

NOTE

Allegare scheda terapia in atto.

*Timbro e firma
Medico inviante*

Data _____

CRITERI DI ELEGGIBILITÀ

Pazienti provenienti dal domicilio in presenza delle seguenti condizioni cliniche:

- ✓ pazienti che, per riacutizzazione di una patologia già nota, necessitano di un periodo di monitoraggio e sorveglianza sanitaria in preparazione di un più adeguato setting domiciliare che richiede educazione ed addestramento del paziente e del caregiver nella somministrazione di farmaci o nella gestione di presidi e dispositivi;
- ✓ programma di monitoraggio/trattamento individuale predisposto dal MMG/UCA o UVM;
- ✓ intensità assistenziale medio-bassa o medio-alta (Indice di Intensità Assistenziale 2 o 3);
- ✓ assenza di instabilità clinica (NEWS2 o altra scala validata di valutazione di stabilità clinica);
- ✓ consenso informato del paziente.

Pazienti provenienti da struttura sanitaria per acuti o riabilitativa in presenza delle seguenti condizioni cliniche:

- ✓ paziente stabile, con diagnosi e programma terapeutico definiti, ma con ancora necessità di interventi sanitari a bassa intensità non erogabili a domicilio;
- ✓ assenza di instabilità clinica (NEWS2 score punteggio da 1 a 4 da almeno 72 e comunque nessuna variabile uguale a 3);
- ✓ intensità assistenziale medio-bassa o medio-alta (Indice di Intensità Assistenziale 2 o 3);
- ✓ percorso diagnostico completato;
- ✓ prognosi stimata con attesa di risoluzione del problema principale a breve termine (massimo 30 giorni);
- ✓ programma di trattamento individuale predisposto prima della dimissione;
- ✓ consenso informato del paziente;

CRITERI DI ESCLUSIONE

- ✓ pazienti con patologie acute in atto o con patologie croniche riacutizzate non stabilizzati (scala NEWS2 ≥ 5 o uno dei parametri uguali a 3);
- ✓ pazienti con diagnosi non ancora definita;
- ✓ paziente con intensità assistenziale alta Indice di Intensità Assistenziale > 3 ;
- ✓ pazienti che rientrano già nei criteri di assistenza in C-dom con setting domiciliare adeguato;
- ✓ pazienti psichiatrici non controllati dalla terapia;
- ✓ pazienti per i quali sono già previsti setting specifici specializzati (come, ad esempio, le persone in stato vegetativo permanente, gli affetti da SLA, ecc.)
- ✓ presenza/persistenza di delirium all'atto dell'invio;
- ✓ pazienti per i quali sono presenti i criteri di eleggibilità alla rete delle cure palliative;
- ✓ sono altresì esclusi ricoveri di sollievo o per motivazioni esclusivamente di natura socioeconomica;
- ✓ pazienti pediatrici.